

University of Groningen

Bepaling van de pijndrempel door middel van elektrische prikkels en haar klinische toepassing

Notermans, Servatius Lanbertus Hubertus

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1962

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Notermans, S. L. H. (1962). *Bepaling van de pijndrempel door middel van elektrische prikkels en haar klinische toepassing*. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN

I

Voor een onderzoek naar het pijngevoel met behulp van elektrische prikkels, dient men de stroomsterkte als parameter te gebruiken en niet de spanning.

II

Het toedienen van ureum aan patienten met een ernstig schedelletsel dient als een kunstfout te worden aangemerkt, indien een intracraniële bloeding niet met voldoende zekerheid is uitgesloten.

III

Het verdient aanbeveling om bij psychiatrische patienten een blanco schedelonderzoek als routine te verrichten.

IV

Het is waarschijnlijk dat de afwijkingen bij de ziekte van von Hippel-Lindau tot de misvormingen moeten worden gerekend.

V

Bij een eenzijdige gehoorsafname dient men met de mogelijkheid van een brughoektumor rekening te houden.

VI

De pinktop-handgreep, door Kranenburg beschreven, is van generlei waarde bij de bestrijding van bloedingen uit de arteria meningea media.

VII

De conservatieve therapie van de spondylolisthesis verdient in vele gevallen de voorkeur.

VIII

Voor de behandeling van hypertensie ten gevolge van nierarteriëstenose, kan het pathologisch-anatomisch onderzoek van door biopsie verkregen materiaal van beide nieren belangrijk zijn.

IX

De resocialisatie van psychiatrische patienten dient reeds binnen de inrichting, respectievelijk kliniek, een aanvang te nemen; tijdens de behandeling moet terdege rekening worden gehouden met ontslagangst van de patient.

X

Een verhoging van de pijndrempel mag niet zonder meer als maatstaf voor de werking van analgetica worden genomen; een dubbel blindproef is noodzakelijk.

XI

Indien op de kinderleeftijd een langdurige behandeling met cortico-steroiden is geïndiceerd, verdient het aanbeveling om zo mogelijk gebruik te maken van cortison, respectievelijk hydro-cortison, in verband met de invloed op de lengtegroei.

XII

Tegen de huidige wijze waarop de geneesmiddel-reclame wordt gevoerd, kan men ernstige bezwaren opperen.

Stellingen behorende bij het proefschrift van

S. H. L. NOTERMANS

Bepaling van de pijndrempel door middel
van elektrische prikkels en haar klinische toepassing

Groningen 1962